

四庫全書

子部

# 欽定四庫全書

子部

普濟方卷二百七十五

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官典簿臣劉景岳

騰錄監生臣林大本

欽定四庫全書

普濟方卷一百七十四 明

周王朱橚撰

積聚門

米瘕

附論

夫病源人有好啖米轉久彌嗜啖之若不得米則胃中  
清水出得米便止米不消化遂生瘕結其人常思米而  
不能飲食久則斃人

方

治米癥其疾常欲食米若不得米則胸中清水出

鷄屎

一升白米五合

右合炒取米焦擣篩為散用水一升頓服取盡少時即吐出癥如研米汁碎若無癥即吐白沫淡水乃厭米不復食之

治米癥久不療羸瘦此方神效

葱白

烏梅

三十枚

右以水三升宿漬烏梅使得極濃清晨取葱白隨飲

烏梅汁令盡損覺心腹煩欲吐即令出之三晨療之  
當吐去米癥差無所忌

治食生米方

家藏經  
驗方

男子婦人因食生熟物留滯於

脾胃遂至生虫久則好食生米否則終日不樂至於  
肌膚憔悴面色萎黃不思飲食以害其生

右用蒼朮不拘多少米泔水浸一宿取出剉碎焙乾  
碾為細末煮稀麪糊為丸如梧桐子大每服五十粒  
空心食前米飲下日三服 益昌伶人劉清嘯家一

婢曰花翠年踰笄病此三月餘監惠民局趙尹能醫  
以此治之兩旬而愈蓋生米留滯於脾胃受濕則穀  
不磨致成此疾蒼朮能去濕煖胃消穀故也尹先云  
曾用此藥療絳州常振省幹兩旬而痊因筆於冊

髮癥附論

病源云有人因飲食內誤有頭髮隨食而入胃成癥  
喉間如有蟲下上來去者是也

方

食中有髮不覺因食而入久則胃間如有蟲狀上下去  
來惟欲飲油一日之中飲至三二升不欲飲食者為髮

癥

治出聖  
惠方

右用油一升以香澤煎之大搔鉗貯之安病人頭邊  
令口鼻臨油上勿令得飲轉鼻面令有香氣當叫喚  
取飲食不得與之必當疲極大睡其髮癥當從口出  
令一人專守視之并脩石灰一裹見癥出以灰粉手  
捉癥抽出及盡即是髮也初從腹中出形如流水中

濃菜隨髮長短形亦如之

又方

出千金方

右用酒三升煮猪脂三升二沸服一升日二白馬尿服之亦佳無白馬白牛亦得

療胃喉間覺有癥蟲上下偏聞葱豉食香此是髮蟲故也

右用油煎葱豉令香二日不食張口而卧將油葱豉置其口邊蟲當漸出徐徐以物引去之無所忌



治誤食頭髮如蟲疾者

右雄黃研細水飛過酒調服吐出惡物乃愈

蝨癥附論

病源云人有多蝨性好齧既多而臟腑虛弱不能消之  
不幸變化生癥而患之者亦少俗云患蝨癥人見蝨必  
齧之不能禁止蝨生長在腹內時有從下部出亦斃人  
方

療蝨癥蝨在腹生長為蝨癥方

出千金方

故篋子

一枚 故梳子

一枚

右二味各破為兩分各取一分燒作灰取一分以水五升煮取一升取頓服前未盡少時當病出無所忌

驚癥

附論

病源云驚癥者謂腹內癥結如驚之形狀也有驚觸冷不消而生癥者也有食雜物得冷不消變化而作者此皆脾胃氣弱而遇生冷不尅消故也癥者其病結成推之不動移是也

方

蟹瓜丸

治蟹癥狀在心下手揣見頭足時轉動并痛

蟹瓜

分三

附子

分六

麝香

分三

半夏

分六

生薑

分四

蟹甲

分六

防

葵

分六

郁李仁

分八

右搗篩密和如梧子大空肚以酒下二十九日再服

以知為度忌生冷油鹹熱麪蕎麥陳臭粘膩羊肉餚

猪肉菟菜

宿癥及卒得癥方

出肘後方

古用白雌鷄一雙絕食一宿明旦以膏熬飯飼之取其尿無問多少小便和之於銅器中火上熬燥搗篩每服錢許日四五服消盡乃止常飼鷄取尿病差後殺鷄單食之

治鰲臍服白馬尿一升五合溫服之令盡差

治鰲臍腹堅硬腫起大如盆服卧不得方

出千金方

右取鹽一升搗水三升絞取汁每服一升日二若食中得病為鰲臍在心下堅強硬者並須服之

又方

出千金方

右蒴藿根白皮一握研取汁水和頓服之

又方

出千金方

右用白馬尿一升雞子三枚取白二合空腹頓服不移時當吐病出

又方

出千金方

右雞屎一升炒令黃取五合以酒一升浸取半搗為末以所浸酒服方寸七日二服三日中作一劑

治人龜病

人門龜病不能言 肚裏生成硬似磚

自死殭蠶白馬尿 不過時旬軟如綿

結瘕附論

結瘕者積聚之類也結伏積聚久不散謂之結凝滯腹內按抑有形謂之結瘕之證形體瘦悴食不知飢飽中陰寒冷濕之氣則發而腹脇塊硬隱隱然痛者是也瘕之證腹中氣痛動轉橫連脇下有如癖氣過脾胃有冷

陽氣不足而發動者是也

方

檳榔湯

出聖濟總錄

治結瘕脉弦腹滿坐卧不安食即欲

吐喘急

檳榔

一兩半

赤茯苓

芍藥

陳橘皮

吳茱萸

郁李仁

訶梨勒

各三分

京三稜

桑根白皮

各一兩

右搗粗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服

食前後各一服若服後頻利即減檳榔郁李仁

紫葛丸

出聖濟總錄

治結臍腹脹堅硬如石肚上青筋浮

起

紫葛

一兩芍藥

桔梗

紫苑

木香

訶梨勒皮

各三

大黃

一兩半

牽牛子

半兩

郁李仁

一兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服十五丸空腹煎

木通及棗湯下老弱量減丸數

防已湯

出聖濟總錄

治結臍氣積腹滿如石氣急少卧小

便不利



防己

百合

郁李仁

各一兩

木通

一兩半

吳茱萸

半兩

陳橘皮

當歸

赤茯苓

各三兩

右搗篩為散每服三錢水一盞生薑半分至六分去

滓空心溫服

羌活丸

出聖濟總錄

治結瘕氣塊飲食不消肺氣發心胃

中逆氣喘卒中風毒脚氣大腸祕澀奔豚氣痛

羌活

桂皮

去粗

芎藭

木香

檳榔

各一兩

郁李仁

大黃

各二兩

右除郁李仁外搗羅為末與郁李仁研勻煉蜜和丸  
如梧桐子大每服二十丸空心煎生薑湯下或棗湯  
下氣痛溫酒下

木通湯

出聖濟  
總錄

治結瘕腹脹堅硬不消

木通

赤茯苓

各一兩

赤芍藥

吳茱萸

各三分

檳榔

一枚紫苑

郁李仁

各半兩

右麤搗篩每服三錢水一盞半煎取七分空腹服日

再

防已散

出聖濟總錄

治結瘕癖實腹滿如鼓食即欲吐喘

息急其脉弦而緊

防已

訶梨勒

郁李仁

白朮

檳榔

各一兩半

吳

茱萸

炒三分

右除郁李仁外搗羅為散入郁李仁同研令勻每服

三錢水一盞煎至六分和滓空心溫服

木香湯

出聖濟總錄

治遠年虛實積聚癥塊

木香

一兩

海馬子

一對

大黃

青橘皮

白牽牛

各二兩

巴豆  
四十粒

右以童子小便浸青橘皮軟裹巴豆以綿繫定入小便內再浸七日取出麪炒黃去巴豆只用青橘皮并餘藥粗搗篩每服二錢七分水一盞煎至三五沸去滓臨卧溫服

木香煎丸

治結瘕積聚血結刺痛

方見本門

蛇瘕  
附論

病源云有人食蛇不消因腹内生蛇瘕也亦有蛇之津

液誤入飲食內亦令人病瘕其狀常若饑而食則不下  
喉噎塞食至胃內即吐出其病在腹揣摸亦有蛇狀謂  
蛇瘕也

方

療蛇瘕大黃湯

出千金方

大黃

半兩芒硝

一枚

烏魚骨

三枚

黃芩

半兩

甘草

一尺

皂莢

六枚

右咬咀以水六升煮之三沸下絞去滓內芒硝候溫  
盡服之十日一劑煮作如上法欲服之宿無食平旦

服當下病也忌海藻松菜等

治蛇瘕方

出聖惠方

川芎

半兩

烏賊魚骨

半兩

川大黃

半兩

防葵

半兩

皂莢

半兩

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓溫服  
日三四服

又方

出聖惠方

雄黃

一分

白礬

一分

硃砂

一分

膩粉

錢一

麝香

一分

巴豆

七粒

十粒

右為末以桃膠和丸如菰豆大每服以溫酒下五丸

日三四服

治蛇癰瘡方

出千金方

右以白馬尾切長五分酒服方寸匕大者自出更服  
二分者一方寸匕中者亦出更服三分者一方寸匕  
小者復出不可損作一服殺人

鼈瘕附論

病源云鼈瘕者謂腹內瘕結如鼈狀是也有食鼈觸冷  
不消而生者亦有食諸雜冷物變化而作者皆由脾胃

虛弱而遇冷即不能尅消所致瘕言瘕也謂其形假而推移也昔曾有人共奴俱患鼈瘕奴在前死遂破其腹得一白鼈仍故活有人乘白馬來看此物白馬忽尿墮落鼈上即縮頭及脚尋以白馬尿灌之即化為水其主曰吾將愈矣即服之果如其言得差故養生云六月勿食澤中水令人成鼈瘕

方

療鼈瘕方

出聖惠方



大黃

六銖

乾薑

兩半

附子

九銖

人參

九銖

廣蟲

大一寸

側子

兩半

桂心

六銖

貝母

兩半

白朮

兩一

細辛

十八銖

右十味搗篩以酒服半方寸匕日三忌生菜葱桃

李雀肉猪肉冷水一方有檳榔

又方

出聖惠方

防葵

兩一

鼈甲

兩一

苦楝子

兩一

郁李仁

兩一

檳榔

兩一

右為細散每服以溫酒下二錢日三四服

患鼈瘕者

出本草

右用新赤黍米取泔水汁生服一升不過三兩度愈

魚瘕 附論

夫人胃氣虛弱者食生魚因為冷氣所搏不能消之結  
魚瘕揣之有形狀如魚是也亦有飲陂湖之水誤有小  
魚入腹不死便即生長亦有形狀如魚故以名也

方

治食魚鱠及生肉住胃膈中不化吐之不出便成癥瘕

方 出聖  
惠方

厚朴一兩 川大黃二兩

右為散作二服每服以酒一大盞煮取六分去滓放  
溫盡服良久再服

療食魚鱠及生肉佳胃腸中不消化吐之不出多成癥

病出聖  
惠方

朴硝一枚 大黃二兩

右以酒二斤煮取一斤去滓盡服之立消無朴硝用  
芒硝硝石亦佳一方為散每服三錢以酒一中盞煎

至六分去滓空腹溫服當下利即差

治食膾不消方及生肉住胃膈不化心成癥瘕

出聖  
惠方

右搗馬鞭草汁一大盞煎五七沸溫分二服盡即消

服生薑汁亦消

又方

出聖  
惠方

右以魚鱗燒作灰細研每服以新汲水調下一錢

治食魚肉等成癥結在腹內并諸毒方

出十  
金方

右以狗屎五升燒末綿裹以酒一斗浸再宿漉取清

分十服日三三日令盡隨所食癥結即出

治食魚鱸腹中脹滿成癥痛悶飲食不下日漸瘦

用水中石子數十枚火烧赤投五升水中各七遍即  
熱飲之如此三五度當利出癥也

瘕癖附論

夫瘕癖本因邪冷之氣積聚一向而生也瘕者在腹內  
近臍左右各有一條筋脉急痛大者如臂因氣而成如  
弦之狀名曰弦氣也癖者則在兩肋之間有時而癖故

曰癖也夫弦之與癖名號雖殊針石湯丸主療無別此  
皆陰陽不和經驗否膈飲食停滯不得宣流邪冷之氣  
搏結不散故曰瘕癖也

方

木香通氣丸

出聖惠方

治瘕癖氣滯心腹痞滿嘔逆咳嗽

消痰進食散痞

人參 木香

各一兩半

元胡 陳皮

各一兩半

黑牽牛

各六兩

榔 丁香

各半兩

荊三稜

各三兩

廣茂

各半兩

茴香

木通 神麴 麥蘖 青皮 各三兩

右為細末水糊為丸如小豆大每服二三十丸生薑

湯下食後日進二服

硃砂三稜丸 主瘰癧氣塊留滯一切內傷

石三稜 荊三稜 雞爪三稜 蓬朮 枳殼

川練子 茴香 青皮 當歸 各半兩 檳榔 七錢半 丁

香 二錢 木香 三錢 巴豆 肉豆蔻 七錢半 硃砂 五錢

右為細末除硃砂外生薑釀汁打糊亦用麴成劑為

丸如小豆大每服十五丸薑湯下溫水亦得

療瘧癖氣兩脇脹滿方

牛膝

大黃

各十分

桔梗

芍藥

枳實

白朮

各八分

分

人參

柴胡

桂心

各六兩

鼈甲

茯苓

訶梨

勒皮

各八分

右搗蜜和丸如梧桐子大空心酒飲及薑湯任下二

十九日二服漸加至三十九利多即有意減之常取

微通洩為度忌生硬難消油膩等物及菟棗桃李雀



肉猪肉冷水生葱

開結妙功丸 治怫熱內盛瘧間積酒積食積一切  
腸垢癥瘕積聚疼痛脹悶作發有時三焦擁滯二腸  
燥澁懊懷心煩不得眠嗽逆不能食或風濕熱兼  
為腫脹黃瘦眼澁昏睡一切所傷心腹暴痛風熱燥  
鬱偏頭疼筋脉拘換肢體麻痺走注疼痛頭目眩  
中風偏染邪氣上逆上實下虛脚膝冷痛常服保養  
宣通血氣消進飲食

荆三稜 茴香 神麴 麥蘖 大黃 乾薑

各一兩

錢 二川烏頭

四分半

夏半兩

桂錢二

巴豆

四枚

牽牛錢三

右為細末用膏丸小豆大生薑湯下十九十五丸或嚼生薑溫水或只用溫水涼水下亦得漸加至三十丸或心胃間稍覺藥力煖心然即却減丸數以意加減無時日三服或取久積或破堅積初服十九次服二十丸每服加十丸三服以加至快利三五行後如常服少得食力更後加取利以意消息病去為度

病甚者自三五丸加服

二香三稜丸

出聖濟  
總錄

治瘰癧結塊面黃肌瘦腹引痛

不欲飲食宿滯冷痰

丁香 木香

各一兩

荊三稜

鷄瓜三稜

石三稜

各三分

硃砂

牽牛子

大黃

蓬莪茂

各半兩

檳榔

一兩 烏梅肉

二兩 巴豆

五十枚

右為末再研勻酒煮糊和丸如棗豆大每服五丸至  
七丸陳橘皮湯下食後服

木香三稜丸 治心腹痞癖癥瘕氣塊腸胃積聚上下

不通

木香

七錢

荆三稜

一錢半

石三稜

一兩半

蓬朮

一兩半

青皮

一錢半

肉豆蔻

四兩

鷄爪黃連

檳榔

四兩

巴豆

三二枚

右為末水煮生薑取醞汁打糊成劑為丸如小豆大

每服十丸溫生薑湯下或溫水送下不以時候日進

一服斟酌虛實加減丸數

鷄爪三稜丸 治五臟痞癖氣塊

鷄爪三棱 石三棱 京三棱 木香 青皮

陳皮各半兩 硃砂分三 檳榔 肉豆蔻各一兩

右為細末生薑汁麪糊為丸如桐子大生薑湯下一方無陳皮云年深者一月見効忌一切生冷硬物及滑物

木香丸出聖惠方 治瘧癖氣脇肋妨悶不欲飲食四肢瘦

弱

木香半兩 乾薑一兩 草豆蔻一兩 桂心一兩 當歸一兩 陳橘皮

一附子一兩巴豆五十枚

右件藥搗羅為末入巴豆研令勻煉蜜和搗三二百杵丸如菉豆大每服食前以粥飲下五丸

京三稜丸 治丈夫婦人瘕癖氣一切積滯

京三稜 芫花各三兩蓬莪茂 桂各一兩附子一兩半

乳香 硃砂各一分巴豆

右搗研令勻每用藥味二兩鎔黃臘一兩蜜少許同和丸如梧桐子大丹砂為衣生薑木瓜湯下二丸至

三九甘草生薑湯下亦得者虛實臨時用

烏頭丸

出聖惠方

療癖瘕積冷發如錐刀所刺鬼疰往來

者

烏豆 人參 桂心 附子 乾薑 赤石脂

各八

分 硃砂

研三分

右搗篩蜜和為丸如梧桐子大以煖酒服七丸稍稍加至十丸忌生冷醋滑豬魚雞蒜小豆油膩牛馬肉生血物生葱等物

療瘰癧

右以蓼每日取一握水煮服之

療瘰癧

右以鼠屎一大合炒將黃濕者炒乾即不須炒即用  
以水二升煮五六沸及熱瀉取汁置椀中急內硃砂  
一小兩乃蓋頭經宿明日平旦溫為兩服稍晚食無  
所忌

大黃散 治瘰癧氣連心肋相引痛堅硬



川大黃

一兩

當歸

一兩

白朮

一兩

枳殼

一兩

柴胡

一兩

鼈甲

一兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半

分煎至五分去滓不計時候溫服

吳茱萸散

出聖惠方

治瘧瘵氣不消

吳茱萸

半兩

鼈甲

三兩

川大黃

一兩

當歸

三分

京三稜

一兩

檳榔

榔

一兩

右件藥搗細羅為散每服食前以煖酒調下一錢

丁香散

出宣明論

治瘧瘵氣脇下痞滿息而不消積而不

散元氣在胃而妨食者

好丁香

二十枚

白丁香

七十枚

蜜陀僧

舶上硫黃

黃鷹調

各半錢

右為末每服一匙皂子煎湯調下不計時候治肚內硬生物肌膚黑瘦如柴嘔吐積滯日三服食後

妙應丸

治老人虛人一切虛寒瘰癧積塊攻脹疼痛

諸臟氣虛積聚煩悶及飲食中蠱毒或食水陸葷子外入腹而成蟲蛇魚蠃或宿食留飲婦人產後敗血

不消女子月水不通結為癥瘕時發寒熱唇口焦黑  
肢體瘦削嗜卧多壓食少腹痛大便糟粕變成冷痢

黑附子

二枚

硃砂

三錢

木香

七錢半

破故紙

華撥

各一兩

兩

右將飛過硃砂末作附子氣內却用剉出附子末蓋  
口用和成白麪裹附子熟約半指厚慢灰火內煨令  
黃色去麪同木香等為細末却將元裹等為末黃麪  
醋調煮糊為丸如菉豆大每服十五丸至二十九食  
後生薑湯下一方有青皮

消滯千金丸 治證同前

牽牛

四兩

香附子

二兩

五靈脂

半兩

京三稜

五錢

右為末醋糊為丸每服二三丸甘草湯下

桃仁丸 療十年瘡癬

桃仁

六升

豉

六升

蜀椒

三兩

乾薑

三兩

右先搗桃仁如脂合搗千杵如乾可少許蜜和搗令

可丸空肚酒服三丸如酸棗大日三

鼈甲丸

出聖惠方

治瘰癧氣塊不消令人羸瘦面色萎黃

四肢少力不欲飲食

鼈甲三兩 京三稜三兩 分川大黃三兩 陳橘皮三兩

右件藥搗羅為末於銀鍋中入米醋三升以慢火熬成膏候可丸即丸如梧桐子大每於食後以粥飲下  
三十丸

芫花丸出聖惠方 治瘡癖氣疼痛

芫花半兩 硃砂一兩 乾薑半兩 京三稜半兩

右件搗藥為末用硃砂醋熬成膏以蒸餅少許同和

丸如菉豆大每服食前以薑橘皮湯下十丸

加減麻仁丸 療積年患氣不能飲食兼食不消化風

氣冷氣熱氣衝上瘡癖氣并乳食氣發動並療之服

經三四日自覺有效

蜀大黃

四兩

訶梨皮

四兩

人參

二兩

大麻仁

二兩

右搗篩依法以蜜和丸每服十丸二十丸增減以意

量之以溲利病除亦不損予常服三十餘年至八十歲萬

病皆無百無所忌補理腰脚服經七八日腰腎先冷

者即下膿水腰脚輕健以酒飲下之並得

治大人小兒瘰癧氣塊往來疼痛不止又治心氣痛不可忍者

白玉 赤玉

右為細末用水糊為丸如梧子大每服三十丸薑湯送下

又方

南星製香附子各等分

右為末薑汁丸每服二三十丸熱薑湯下

治丈夫瘰癧兩肋虛脹此法出傳屍方

猪脰

具一青蒿葉

右以無灰酒一大升微火溫之乘熱內猪脰中和蒿葉相共煖使消盡又取桂心一小兩別搗為末內酒中每日平旦空腹取一小盞服之午時夜間各再一服甚驗忌熱麪油膩等

治冷氣瘰癧羸瘦

方見本門



治積冷瘕癖氣不思飲食四肢羸困宜服此方

葇宕子

分三大棗四十粒

右件藥以水三升相和煮水盡即取棗去皮核每於食前喫一枚粥飲下亦得覺熱即止

治瘕癖不差脇下痛硬如石方

出聖惠方

生商陸根汁

一升棗仁一兩

右件藥研杏仁令爛以商陸根汁和研濾取汁以火煎如飴每服取棗許大空腹以熱酒調服之漸加以

利惡物為度

治瘡癖氣不消方

出聖  
惠方

京三稜

一兩  
川大黃  
一兩

右件藥搗羅為末用醋熬為膏每日空心以生薑橘皮湯下一茶匙

大黃丸

出聖  
惠方

治瘡癖氣時攻心腹疼痛令人不思飲

食漸為瘦病

川大黃

一斤  
三兩  
枳殼  
半

當歸  
一兩  
半

赤芍藥

一兩

半  
京三稜  
三兩  
吳茱萸  
一兩

右件藥搗羅為末先以米醋三升熬大黃為膏次入諸藥和丸如梧桐子大每服於食前以溫酒下三十丸

消飲方 治一切積聚瘕癖氣塊及大小結膏痛不能抑按

天南星 半夏 芫花 自然銅  
各等分

右為末醋煮麪糊為丸如梧桐子大每服七丸食前

溫水下良久葱粥投之相虛實加減

硃砂丸

出聖惠方

治瘧癰冷癰塊及療丈夫腰脚補煖水

藏善治婦人氣血暖子宮殺三蟲伏火

右先取臘月細桑條子不限多少燒作灰畧以水淋却苦汁後將灰晾乾收之每一兩硃砂用灰三兩先研硃砂以水化消拌灰令乾濕得所取一固濟了瓷瓶子底下先鋪乾灰半寸已來次下硃砂灰填實口頭更著乾灰覆蓋後用文火燒後武火煨令通赤候冷

取出重研於竹筍箕內鋪紙三重後安灰以水淋之  
候藥透過紙待硃砂味斷即休淋水別取小瓷鉢子  
一兩箇盛藥汁於熱灰火內養之常令魚眼沸直至  
汁盡候乾別入固濟了瓶子內便以大火煨一食久  
待取出細研用粟米飯和丸如菉豆大每日空心以  
暖酒下五丸

桃仁煎 治瘰癧氣心腹疼痛肌膚瘦弱面無顏色及  
男子元氣婦人血氣不足

右以桃仁二千枚湯浸去尖皮雙仁細研如膏以酒二歧淘濾取汁於淨鐺中以慢火煎成膏每於食前以暖酒調下一茶匙

檳榔煎丸

出聖濟總錄

治瘥癖氣及兩脇積聚并婦人血

刺疼痛

檳榔

三兩

吳茱萸

一升

硫黃

京三稜

半升

巴豆

各一兩

木

香

白豆蔻

肉豆蔻

桂

去粗皮

陳橘皮

青橘

皮

高良薑

畢撥

訶梨勒皮

白朮

各一兩

胡

椒

一兩

當歸

乾漆

各半兩

草豆蔻

一兩

右為末與前三味膏同搜丸如菰豆大每服生薑湯

下三五丸食後服

鼈甲丸

出聖濟總錄

治瘰癧氣塊

鼈甲

二兩

乾薑

大黃

硃砂

一兩半

附子

檳榔

桂皮

粗乾漆

京三稜

木香

訶梨勒

水銀

各一兩

墨

燒半兩

右為末用麴米三兩濃醋二升同煎成膏和上件藥

丸如梧桐子大每服七丸加至十丸不拘時候日三  
丈夫溫酒下婦人醋湯下不嚼即破取下血塊如雞  
肝色是効

治瘰癧氣食物不消宜服此方

木香

一兩

硫黃

一兩

川大黃

三兩

右件藥搗羅為末煉蜜和搗三百杵丸如梧桐子  
大食前以溫酒下二十丸

又方

出聖  
惠方



蒼朮

一兩 川烏

二兩

赤芍藥

半兩

右件藥搗羅為末用醋煮麴糊和丸如梧桐子大每

服食前以生薑湯下二十九

半硫丸

出仁存方

治年高風秘冷秘心腹一切瘧癖冷氣

暖元臟止洩泄飲食

硫黃

研細 半夏

湯浸七次

右以生薑汁同熬炊餅末攪勻杵丸如梧桐子大空

心溫酒薑湯下五十丸或用葱白一條生薑三片煎

熟入阿膠二片溶開下

木香通氣丸

治內熱結成瘕癖堅積酒食所傷一切

腸垢積聚疼痛脹悶作發有時脹滿心腹暴痛邪氣  
上逆升而不降並宜服之

木香 京三稜 元胡索 當歸 黃芩 桔梗

連翹

各一兩

大黃

二兩半

桂

半兩

牽牛

四兩

甘草

三兩

大梔子

半兩

黃蘗

二兩

右同為細末煉蜜為丸如豌豆大每服三十至五十

丸溫水不拘時候通利為度

牛黃神金丹 治一切堅積瘰癧氣塊腹脇滿硬疼痛  
及小兒驚癇積塊氣喘痰涎嘔吐泄瀉寒熱瘧疾

輕粉 粉霜 硃砂 雄黃 硃砂 巴豆 信

各一錢 黃丹 黃蠟 各三錢

右各研為末次研巴豆爛如油却鎔蠟軟搜和作劑  
旋丸如小豆大每服一九新水送下小兒粟米大量  
虛實用

治老婦血癥男子瘰癧痞悶

奴柘草 三稜草 馬鞭草

右三味煎如稠糖病在心食後服在臍空心服當有惡物下

治瘰癧諸塊伏梁

鴈月雄雀尿

溫

乾薑

桂

味甘辛大熱有小毒

艾味苦

右四味乾薑桂心等分為末將鴈月雄雀尿和為丸如梧桐子大溫水服三五丸入腹爛瘰癧

治瘡癰癰瘦

右猪脰和棗肉浸酒服之

破冷瘡癰

右用生栗楮生食良

治瘡癰

右用大蒜日食三顆昔有患瘡癰者夢人教每日食三顆大蒜初時依夢遂至瞑眩口中吐逆下部如火後有人教令取數斤合皮截却兩頭吞之名為內炙

依此大効

主瘡癰安心定志 聰明耳目除邪逐風變白性溫不寒

右取葇荑子暴乾隔日空腹水下一措捻勿令子破破則令人發狂亦用小便浸之令小便盡暴乾依前服之

治瘡癰痞滿

出本草

右用苦丹苗子煮汁服亦生搗絞汁服

治瘧癖

出本  
草

用醋煎大黃服之佳

治癖

鼈甲

炒令  
黃色

訶梨勒皮 乾薑

右三味等分為末酒浸為丸如桐子大空腹酒服二  
十丸

久瘧癖

附論

夫久瘧癖氣者本因邪氣所生不離陰陽之氣結畜而

成也此皆由臟腑不調脾胃虛弱飲食積滯不能宣行復遇寒氣在內即結聚而不散於臍脇左右弦急絀起時有腹痛時人多患此病卒差極難累月逾年積聚成也故名久瘕癖氣也

方

烏頭丸

出聖惠方

治久瘕癖氣腹內積聚邪氣往來決逆

搶心心胃痺悶吐逆飲食

川烏頭

一兩半

吳茱萸

三川椒

三乾薑

三桂心

三柴

分

分

分



胡一兩生薑 地黃一兩細辛半兩紫苑半兩人參半兩芎藭

半兩白朮半兩白芫半兩赤芍藥半兩皂莢半兩

右件藥搗羅為末煉蜜和搗三二百杵和丸如梧桐子大每服不計時候溫酒下二十丸

京三稜丸出聖惠方治久疰癖氣心腹脹滿時時攢連心

背痛宿食不消嘔吐不思飲食氣息喘促面目黃瘦  
虛腫

京三稜分三鼈甲一兩川大黃一兩木香半兩當歸分三白

木

分三厚朴兩

吳茱萸

半兩

麥蘖

兩

訶梨勒

兩

枳殼

兩

神麴

兩

桂心

兩

檳榔

兩

右件藥搗羅為末煉蜜和搗五七百杵丸如梧桐子

大每服不拘時候以粥飲下三十丸

大黃丸

出聖惠方

治久瘕癖氣發歇不定肌肉消瘦往往

吐逆肩背疼痛宜服

川大黃

兩

川朴硝

兩

蓬莪茂

兩

訶梨勒

兩

桂心

分三

枳殼

兩

吳茱萸

分三

金星礬石

兩

柴胡

兩

狼毒

兩

巴

豆一分

右件藥搗羅為末研入巴豆礬石令勻以熟棗瓤和搗三二百杵丸如梧桐子大每日空心以溫酒下十丸老少臨時加減數服之

葶藶丸

出惠聖方

治久瘕癖氣或時嘔噦腹痛不能飲食

葶藶

一兩乾薑

三分胡椒

三分桂心

三分人參

一兩陳橘皮

三分

訶梨勒

一兩赤茯苓

一兩檳榔

二兩

右件藥搗羅為末煉蜜和搗五七百杵丸如梧桐子

大每服不計時候以粥飲下二十九

瘕癖 附論

夫瘕癖者由陰陽不調臟腑虛弱邪冷之氣結聚而生也其狀腹內連臍左右各有一條筋脉急大如臂次者如指拘急如弦之狀名曰瘕氣也 瘕氣謂臍腹左右堅硬而痛橫連如臂取象如弓弦之急故謂之瘕氣蓋因寒溫失宜房欲過度真陽虛憊致內冷生所以水飲入於胃而不能消沅於脇下經久不去遂成痼疾若遇

陰寒或食冷物作痛久則不能飲食肌膚消瘦

方

療瘧氣方

牛漆 芍藥 桔梗 厚朴 茯苓 訶梨勒

柴胡 大黃 各六分 枳實 蒺藜子 人參 各五分 橘

皮 檳榔 各四分

右搗篩蜜和丸空肚煮大棗飲服如梧桐子大二  
十九日再漸漸加至三十九丸如利多以意減之忌生硬

難消物及油膩猪肉醋物

人參湯

出聖濟  
總錄

治疰氣撮痛不能飲食

人參 陳橘皮 白朮

各一兩

赤茯苓

一兩半

右粗搗篩每服三錢以水一盞半入生薑半棗大拍  
破同煎至七分去滓溫服日三

京三稜湯

出聖濟  
總錄

治疰氣積滯不消胃膈痞悶不思

飲食

京三稜 木香 甘草 蓬莪朮

各一兩

藿香葉

一兩

烏藥

懷香子

各半兩

赤茯苓

三分

右粗搗篩每服三錢以水一盞煎至七分去滓食前

溫服

白朮湯

出聖濟總錄

治瘧氣兩肋脹滿不能飲食

白朮

赤茯苓

枳殼

各一兩半

人參

桔梗

各一兩

右粗搗篩每服三錢水一盞生薑半棗大拍破同煎

七分去滓溫服日三

木香丸

出聖濟總錄

治瘧氣胃冷不入飲食

木香 蜀椒

乾薑

各一兩

右為末，鎔蠟和丸，如梧桐子大，空心溫酒下七丸。

緩中湯

出聖濟總錄

治瘕氣急痛腹脹胃虛不下食

甘草一分

龍甲

附子

芍藥

橘皮

厚朴

人

參

枳殼

桂皮

去粗皮

半夏

各半兩

右剉如麻豆，每服五錢，以水一盞半，生薑五片煎取

八分，去滓溫服。

檳榔散

出聖濟總錄

治瘕氣急痛腹脹胃虛不下食



檳榔

兩半

川烏頭

兩一

當歸

兩半

赤芍藥

兩半

陳橘皮

分三

人

參

兩半

枳殼

兩半

乾薑

兩一

桂心

兩半

厚朴

兩半

半夏

兩半

甘草

分一

右件藥搗篩為散三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時服

檳榔丸

出聖惠方

治瘧氣發作兩脇弦急心肋脹痛不能

飲食

檳榔

分三

枳殼

兩一

鼈甲

兩一

桔梗

兩半

人參

兩半

白朮

分三

桂

心分三木香

分二前胡分三川烏頭

分三川大黃一兩官桂

分三

右件藥搗羅為末煉蜜和搗三百杵丸如梧桐子  
大每服不計時候以溫酒下三十丸

枳殼丸

出聖濟  
總錄

治瘰癧急痛嘔吐酸水食物多噎

枳殼 木香 薏苡仁 黃連 大黃 人參

白茯苓 附子 楮實 郁李仁

各一兩

右除前研外搗羅為末入郁李仁同研勻入枳殼煎  
和搜如硬入少煉熟蜜丸如桐子大空腹煎黃耆湯

下二十九晚再服

烏頭丸

出聖濟  
總錄

治瘰癧氣上攻心脾疰痛嘔吐酸水醋

心

烏頭

二兩

附子

乾薑

一兩

阿魏

木香

肉豆蔻

龍膽

乾椿葉

各三分

當歸

一兩半

桂

去皮  
一兩

右將木香等六味搗羅為末入前煎中和為劑再入  
白搗勻如硬即少蜜丸如梧桐子大每空心服用溫  
水下二十九日三若心脾有痛溫水調蛤粉湯下

甘遂丸

出聖濟  
總錄

治瘕氣

甘遂 芫花 桃仁 芎藭 當歸 訶胡 蜀

椒 吳茱萸 厚朴 桂

各一兩

右除桃仁外搗羅為末入桃仁搗令勻煉蜜和丸如梧桐子大每日空腹煎生薑湯下十九日二

白朮丸

出聖濟  
總錄

治積冷瘕氣口吐清水面色萎黃

白朮 蓬莪茂 木瓜 桂 陳麴 木香 蕪

荑 薑屑

各半兩

北亭 益智

各三分

右搗羅為末用北亭膏和丸如梧桐子大每服二十

丸炒生薑鹽湯下

牽牛子丸

出聖濟  
總錄

治瘕氣只吐酸水醋心常似有物

在胃膈間

牽牛子

生搗  
二兩

硃砂

一兩

桃仁

半

兩

附子

檳榔

人

參

乾薑

木香

丁香

各三  
分

右除煎研外搗羅為末入硃砂桃仁研令勻同入牽

牛子煎中和搜丸如梧桐子大每日空心食後煎生

薑湯下二十九漸加至三十九以利下積滯物為度

肉豆蔻散

出聖惠方

治瘕氣胃中寒不思飲食

肉豆蔻

三分

燕薹

二兩

高良薑

一兩

桂心

一兩

木香

一兩

白朮

一兩 吳茱萸

半兩

桃仁

一兩

厚朴

四兩

右件藥搗篩為散用生薑一斤細切相拌更搗作團以麪裹灰火中煨令通熱去麪候乾搗細羅為散每服不計時候煮棗粥飲調下一錢

訶梨丸

出聖濟總錄

治瘕氣胃臆多滿大腸常澁

訶梨勒 大黃 芍藥 防葵 桂去粗皮 甘草

烏藥 各一兩 鼈甲 二兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大空腹煎生薑湯下二  
十丸日午臨卧再服

甘草丸 出聖濟  
總錄 治瘧氣成塊在臍兩邊疼痛

甘草 桂去粗皮 蘆薈 蜀椒 豉微炒 木香 栝子

仁 蕪荑 各一兩

右除蘆薈外搗羅為末入蘆薈研令勻煉蜜和丸如

桐子大每服令卧食後溫酒下二十丸漸加至三十丸

桂心丸

出聖惠方

治瘧氣急痛不思飲食肌體瘦弱

桂心三分川烏頭一分柴胡一分赤芍藥三分檳榔三分木香三分

半桃仁一分當歸三分

右件藥搗羅為末煉蜜和丸搗三二百杵丸如梧桐

子大每服不計時候以粥飲下二十丸

大黃湯

出聖濟總錄

治瘧癖急痛日漸黃瘦



大黃 芍藥

各二兩

桂

去粗皮

鼈甲

各一兩半

甘草

訶梨

勒 防葵

各一兩

右粗搗篩每服三錢以水一盞煎至六分去滓下朴

硝一字攪勻溫服空心日晚各一以利下爛肉血為

驗

附子丸

出聖濟總錄

治積冷瘕氣口吐清水面色萎黃

附子 草豆蔻

各二兩

桂

去粗皮

吳茱萸

各一兩

丁香

三分

木香 半桃仁

湯浸三兩

右除桃仁外搗羅為末入桃仁研勻別搗羅翹末煮  
糊和丸如梧桐子大每服二十九丸空腹煎生薑橘皮  
湯下日晚再服

大黃丸

出聖濟  
總錄

治瘕氣痞滿口吐酸水大便不通

大黃

二兩 檳榔

丁香

各三兩

訶梨勒

桂

去粗皮

木香

各一兩

右除大黃外共煎搗羅為末再入大黃同煎搜丸如  
梧桐子大每服食後臨卧溫酒下二十九丸漸加至三

十九

桃仁散

出聖惠方

治瘧氣急痛不能飲食

桃仁

一兩

吳茱萸

川烏頭

檳榔

各一兩

木香

一兩當

歸

一兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞煎至六分

去滓不計時候稍熱服

木香丸

治瘧氣兩脇痛不可忍

木香

二分

烏頭

半兩

附子

半兩

乾薑

半兩

巴豆

一分

右件藥搗羅為末入巴豆同研令勻以醋煮麴糊和丸如菉豆大每服不計時候煎生薑醋湯下五丸

狼毒丸

出聖惠方

治瘰癧氣脇肋脹痛腹內結氣不能下食

四肢少力

狼毒

一兩川烏頭

一兩檳榔

一兩木香

一兩乾漆

一兩

右件藥搗羅為末煉蜜和搗一二百杵丸如梧桐子大每服不計時候溫酒下五丸漸加至十丸

木香丸

出聖濟總錄

治瘰癧氣急痛多吐苦水日夜發渴無

常

木香

乾薑

各一兩

烏頭

半兩

桂

去粗皮三分

右為末用米醋三升慢火煎如稀糊和藥末杵丸如梧桐子大每服十五丸空腹生薑湯下日晚再服療腹中瘕氣衝心疼痛緊急方

白朮

枳殼

各三兩

柴胡

四兩

鼈甲

炙二兩

右以水七升煮取二升五合去滓空肚分三服相去七八里久能連服三四劑始知驗禁生冷猪肉并毒

魚鱖服有效忌菹菜桃李雀肉生葱

治瘧氣發渴衝心痛不識人方

出聖惠方

川烏頭

一兩

羌花

一兩醋浸

青橘皮

一兩

吳茱萸

一兩

右件藥搗羅為末以軟飯和丸如梧桐子大每服不計時候以橘皮湯下十丸

巴豆丸

出聖濟總錄

治瘧氣心痛

方見本門

治瘧氣發渴衝心痛不識人方

出聖惠方

桃仁

一兩

吳茱萸

三兩

右二味相和以慢火熬桃仁色稍黃即取出合器盛之密蓋定待冷擇去茱萸留桃仁每日空心爛嚼二七顆以熱酒下晚食前再服

枳殼湯

出聖濟總錄

治瘧氣腹脹兩肋急滿不能飲食頭

痛壯熱身體疼痛

枳殼

一兩半

桔梗

人參

前胡

桂

各一兩

檳榔

半兩

鼈甲

一兩半

右粗搗羅每服三錢以水一盞半入生薑半棗大拍

破同煎至七分滓溫服日三一方用枳實無枳殼

蓬莪茂散

出聖惠方

治瘰癧發渴衝心疼痛不識人方

見方

門奉

治瘰癧其狀腹內疼痛發作有時臨發作疼痛時有一條絃連臍左右強急疼痛大者如臂小者如指急如弦

之狀宜服此方

出護命方

當歸 鼈甲 京三稜 延胡索 牽牛 大黃

檳榔

各半兩

桔梗

羌花

沒藥

木香

各一分

白蒺



藥一桂心八兩銖

右為細末與芫花沒藥同研如飛塵每服三錢不計時候葱湯調下

癖氣附論

夫五臟調和則榮衛氣理津液敷腴則脾胃流轉雖復多飲酒漿亦不能為病若攝養乖方則三焦痞隔而腸胃不能宣行因飲水漿便令停滯不散更遇寒氣積聚而成癖癖者謂僻在左右兩脇之間而痛是也

方

大五明狼毒丸

出千金方

治堅癰瘡在人胸脇或在心腹

狼毒 乾地黄兩四 附子 大黃 茯苓 人參

當歸 細辛 蜀椒 五味子 藺茹各一兩 半夏

麴 乾薑 官桂各一兩半 芫花 莽草 厚朴 防

己 旋覆花兩半 杏仁 巴豆二十枚

右為末蜜和丸如梧桐子大每服二丸旦夜一以知

為度

鼈甲大黃丸

出聖濟總錄

治癖積健脾胃消宿滯

鼈甲

二兩

大黃

檳榔

附子

麥藥

各一兩

烏藥

訶梨勒

木香

白朮

桂

去粗皮

蓬莪茂

京三

稜

枳殼

吳茱萸

各半兩

右為末後將硃砂三兩細研醋三升濾去滓將前藥

末平分一半入硃砂內攪和於鈹子內煎成膏和丸

如梧桐子大空心炒生薑鹽湯下二十九

療癖羸瘠髓酒方

猪肪膏 薑汁 生地黄汁各三升 牛髓二升 油五升 當

歸 蜀椒各四分 吳茱萸 桂心 人參 芎藭各五分

分 乾地黄七分 遠志皮五分 五味子六分

右切搗九味三篩為散取膏髓等五種汁加水一斗  
同汁煎取水并藥汁俱盡但餘膏在俟小冷下散攪  
令調火上煎三上不燥器貯凝冷為餅方寸以清酒  
一升煖下膏取服之晝兩服夜一服非但療癖亦主  
百病忌生葱蕪薤

防葵丸

出聖惠方

治癖氣兩脇下硬按之痛心間欬逆不

下飲食四肢羸瘦積年不瘥

防葵

三分

芎藭

兩半

赤茯苓

三分

鼈甲

一兩

桃仁

三分

枳殼

兩半

木香

兩半

川大黃

兩三

當歸

兩半

乾薑

兩半

桂心

兩半

細辛

兩半

桔梗

兩半

京三稜

三分

右件藥搗羅為末煉蜜和搗五七百杵丸如梧桐子  
大每服不計時候以粥飲下三十丸

防葵丸

出聖濟總錄

治癖氣脇肋妨滿腹脹不思食

方見本門

木香硃砂煎丸 治癖氣積氣血結刺痛

木香一分硃砂半兩巴豆 大黃 京三稜 乾漆

青橘皮 蓬莪茂 附子 桂去粗皮 乾薑各一兩 墨

指一

右將大黃京三稜巴豆三味各搗研為末同於銀石器內以醋一升煎一兩沸次入硃砂同熬成膏次將諸藥搗羅為末用膏和成劑杵千數為丸如菉豆大每服五丸炒生薑湯下結聚腹內氣塊痛乾薑湯或

橘皮湯下食食麪黏食不消成塊聚黃麪湯下食牛  
羊鼈肉成氣塊不散各用本肉淡汁下宿酒不消溫  
酒下婦人諸般血氣當歸酒下妊婦不得服如要宣  
轉茶清下加至七丸小兒三丸

鼈甲丸

出聖  
惠方

治癖氣兩脇下硬如石按之痛心腹痞

滿不能下食心悶欬逆積年不瘥

方見  
本門

療腹中癖氣方

牛膝 枳實 鼈甲 茯苓

各八分

桔梗 芍藥

白朮 人參 厚朴 大黃 桂心 檳榔

各六分

右搗羅蜜和丸空肚溫酒服如梧子大二十丸日二服漸加至三十丸老小微利忌生冷油膩小豆粘食芻菜桃李雀肉醋大蒜葱猪

三稜丸

出聖濟總錄

治食氣癖塊胸膈噎塞冷氣攻刺吐

酸水不美飲食腹脇脹滿痛氣不升降

京三稜 芍藥 桔梗 乾薑 檳榔 吳茱萸

烏頭

各半兩

大黃

訶梨勒

各一兩

鼈甲

半兩

桃仁

三分



右為末酒煮麪糊為丸如梧子大每服十五丸炒橘皮鹽湯下如酒食所傷胸膈不快腹脹醋心熱水下

鼈甲三稜丸

治男子婦人小兒虛中癖氣臟腑不調

飲食不消久致瘦弱不可取轉者服之自然安好又治虛氣膨脹心胸滯悶并婦人產後血積蓐勞瘦瘁甚者

鼈甲

九肋重四兩

京三稜

水浸兩宿

乾漆

各三兩

木香 乾薑

補骨脂

檳榔

沒藥

硃砂

墨

研各一分

右為末再同研勻醋煮麴糊丸如棗豆大每服三十丸生薑鹽湯下婦人血病醋湯下

牛黃湯療癰

牛黃 麝香 硃砂 生犀角

各等分

以上四味並研令極細湯沸後內之

大黃 芩 升麻

各一兩

甘草

鼈甲

半兩

丁香

五

枚

右切以水三升先煮大黃等六味取強半升絞去滓

內牛黃等四味和攪分為三服每服如人行十里久  
忌如藥法若利出如桃膠肉醬等物是病出之候特  
忌牛馬肉其藥及水並是大兩大升此藥分兩是十  
五以上人服十歲以下酌量病減之忌菹菜海藻艾  
菰菜生血物等

必効練中丸 主癖虛熱兩脇下癖痛惡不能食四肢  
酸弱口乾唾涕稠粘眼澁頭時時痛并氣衝背膊虛  
腫大小便澁小腹頭痛髮落耳鳴彌至健忘服十日

許記事如少時無禁忌

大黃

一斤朴硝

十兩

芍藥

八兩桂心

四兩

右搗篩蜜和為丸如梧桐子平旦酒服二十九日再

稍加至三十丸以利為度能積服彌佳縱利不損人

忌生葱

硃砂丸

出聖惠方

治癖氣在兩脇結聚不散

硃砂

半兩

乾薑

半兩

川烏頭

一兩

羌花

半兩

皂莢

半兩

京三稜

半兩

五靈脂

一兩

巴豆

半兩

右件藥搗羅為末入硃砂巴豆同研令勻用醋熬為膏旋丸如梧桐子大每服空心及臨卧時以生薑橘皮湯下二十九一方搗羅為末入硃砂巴豆拌勻再羅每秤此藥末一兩入去皮心膜油煎黑色巴豆二十枚研和勻以醋煮麪糊丸如大麻子大每服五丸至七丸茶酒熟水任下

柴胡飲

出聖濟總錄

治癖氣腹痛兩脇脹滿不飲食

方見本門

小狼毒丸

出千金方

治堅癖瘕在人胸脇或在心腹

狼毒三兩 附子 旋覆花 半夏 藺茹 白附子

各三兩

右為末蜜和丸搗五千杵丸如梧桐子大每服三丸至十九日三一方無半夏白附子藺茹只三味等分  
枸杞子散

枸杞子 乾薑 白朮 橘皮各五兩 吳茱萸一斤 蜀

椒三合

右六味切搗五味三篩下為散取枸杞子燥瓷器貯

研暴如作米粉法七日暴之一暴一研前藥散和之  
又研隨飲酒食等即便服一方寸匕和酒食進之如  
此能三年服非但療百病亦長陽氣忌桃李雀肉魚  
鮓等

鼈甲丸

出聖濟  
總錄

治積年癖氣塊攻心腹

鼈甲

炙一兩

乾薑

半兩

京三稜

一兩

青橘皮

半兩

巴豆

一分

右除巴豆外搗羅為末入巴豆膏和丸如菉豆大每  
服三丸至五丸生薑湯下空心食前服

如意丸

出聖濟  
總錄

治虛積導滯氣消癖塊

硃砂

十二  
塊

巴豆

三十  
枚

大棗

十二  
枚

白丁香

八十  
箇

膩粉

錢一

右將已去核棗六枚水煮熟同搗納餘藥成膏丸如  
菜豆大每服五丸煎生薑湯下小兒二丸至三丸煎  
皂子湯下臨卧服

郁李仁丸

出聖濟  
總錄

治丈夫婦人腹內癖氣

郁李仁 京三稜 芫花 蓬莪茂 木香

各一  
兩



右用醋一斤同煮醋盡焙乾搗羅為末麪糊丸如棗  
豆大每服三五丸生薑湯下日三

吳茱萸丸

出聖惠方

治癖氣脹痛

吳茱萸

半兩

附子

一兩

桃仁

一兩

巴豆

三十枚

乾薑

一兩

右件藥搗羅為末入巴豆研令勻以軟飯和丸如黍  
粒大每服不計時候煎生薑橘皮湯下五丸

硃砂丸

治癖疼痛腹脇脹滿發歇定不可忍不思飲

食

療癖飲并醋咽吐水及食飲不消氣逆脹滿

大腹攢榔

十兩

高良薑

三分

桃仁

一升

右和搗絹篩以白蜜和丸酒服如彈子丸二枚再服  
漸加至四五丸加減任意自量

應通丸

出聖濟總錄

治癖氣發歇疼痛不可忍者宜急服

桂

去粗皮

乾漆

京三棱

當歸

右等分為末醋煮麴糊為丸如梧桐子大燒紙灰酒

下十五丸

破癖丸

白朮 枳實 柴胡

各三兩

右切以水五升煮取二升分溫三服服三十劑永差

忌桃李雀肉

京三稜散

出聖濟總錄

治癖氣在脇下痛久不去

京三稜

半斤

枳殼

一兩

甘草

三兩

右搗篩為散每服三錢入鹽半字沸湯點藥空心食

前服

消癖丸

治癖氣結硬不消胸脇脹悶

出聖惠方

巴豆

一分 硃砂

一分 猪牙皂莢

四兩

右先將皂莢搗羅為末入巴豆研勻用硃砂膏和丸

如菴豆大每服一丸食後臨卧粥飲下

蓬莪茂散

出聖濟總錄

治癖氣發歇衝心疼痛不知人

蓬莪茂

半兩

胡椒

一分 附子

半兩

右搗羅為散每服半錢以醋湯調下不計時候

療癖

出肘後方

右用大黃十兩杵篩以醋三升和勻白蜜兩匙煎堪  
丸如梧桐子大每服三十丸生薑湯吞下以利為度  
小者減之

療腹滿癖堅如石多年不瘥者

出聖  
惠方

用白楊木東南枝去蒼皮護風細剉五升熬令黃以  
酒五升淋訖即以絹袋盛滓還內酒中密封再宿每  
服一合日二食前服

療癖氣

以生薑竿子一片壓破以水五升漬二七日空腹一杯服神良

必効療癖方

取車下李仁微湯退去皮及並仁與乾麴相拌搗之為餅如乾和淡水如常搜麴大小一如病人手掌為二餅微多使黃勿令至熟空肚食一枚當快利設如不利更食一枚或飲熱粥汁即利以快利為度至午後利不止即以醋飲止之利後當虛病未盡者量力

一二日更進一服以病退為限小兒以意量之不得食酪及牛馬肉但病重者李仁與麪相半輕者以意減病減之後服者亦任量力頻試差神効

### 千金散

右治大人小兒脾癖并有疳者宜服錦文大黃三兩為極細末陳醋二大椀用砂鍋內文武火熬成膏子傾在新磚瓦上日晒夜露三朝夜將下來再研為細末後用上高船上硫黃一兩形如虎珀者極妙官粉

一兩將前大黃末一兩三味再研為細末十歲以下  
小兒每服可重半錢食後臨卧米飲湯調服此藥忌  
生硬冷葷魚鷄鵝一切發病之物服藥之後服半月  
白米軟粥如一服不愈後半月之後再服

鼈甲丸 主癖氣發動不能食心腹脹滿或時發熱

鼈甲 枳實 麥門冬 人參

各八分

白朮 芍藥

前胡 厚朴

各六分

右搗篩蜜和為丸如梧桐子飲服二十九漸漸加至



三十九冷即酒服極効禁生物粉酪油膩等亦忌覓

菜桃李雀肉

紫葛膏 治癖氣脇下硬痛心煩不能食

方見本門

如神丸

出聖濟總錄

治久積癖氣心胸不和嘔吐痰逆脇

肋脹滿疼痛

烏頭 乾漆 乾薑 桂

各一兩半 砂兩半 巴豆兩半

右合研令勻取炒棗肉刻成塊用溫紙厚裹鹽泥固濟厚紙密裹日三曝乾地坑子內以木三斤簇燒候

灰銷手取出看硬軟搗碎為丸如小豆大每服三丸至五丸木瓜湯下不拘時

治癖氣積滯發作有時大腑不調或酒食過度停滯不散之所致久而不治當為大病大臟冷然後喫此藥

出護

命方

當歸 芫花 枳殼 官桂 檳榔 黃橘皮 各

分 半夏 桔梗 吳茱萸 細辛 各三錢 白蒺藜

熟牽牛 木香 各半兩

右為細末每服三錢空心以葱湯調下和滓喫

通靈丸 治久患癖塊或因氣不和即發疼痛胸多痞塞消化癥瘕大効

京三稜 醋石榴 杏仁 甘遂 大戟子 大

黃 巴豆 苦葶藶 芫花 五靈脂

各一兩 鹽豉

烏梅

各二兩

右件一十二味藥剉細用水一斗二升入藥於鍋內同熬候水盡就鍋內炒令黃焦色止取出杵為末更

入木香青皮末各一兩拌勻醋煮麴糊為丸如小豆  
大每服薑湯下三五丸心胸痞悶疼橘皮湯下喫酒  
食飽悶生薑湯或茶湯溫水下亦得

治氣結破癖氣及下四肢水

出本草

右用郁李仁四十九粒酒服止瀉尤良

治癖積氣

出本草

右用砒黃磨研酒飲之

治氣瘕癖

出本草

右用土落草作煎酒亦搗絞汁溫服

治一切血氣癥癖

用蚶殼不以多少燒以米醋淬三度埋於地中令壞爛取出為末以醋膏丸酒服之

導引法

養生方云卧覺勿飲水更眠令人作水癖又云飲水忽急咽久成水癖又云舉兩膝夾兩頰邊兩手據地蹲坐故久行之愈伏梁者宿食者不消成癖腹中如

杯如盤宿癰者宿水宿氣癖數生癰久行腸化為筋  
骨變為實

普濟方卷一百七十四